

DENTALKLINIK & LASERKLINIK Dr.TÓKA

9400 SOPRON, LACKNER K. UTCA 62/B

NEVESSEN A KEZELÉSEK ALATT!
VAGY EGYSZERŰEN ALUDJA ÁT AZ EGÉSZET**TÁJÉKOZTATÓ FÜZET
BÓDÍTÁSBAN VÉGZETT KEZELÉSEKHEZ**

Az orvoslás nagy eredménye, hogy a kezeléseket már fájdalom nélkül, érzéstelenítésben tudjuk végezni. Sokan azonban félnek a kezelésektől és ez a félelem, szorongás megnehezíti a pontos, precíz munkavégzést. Ilyenkor ajánljuk, hogy a kezelést bódításban végezzük el. Világszerte ugyanolyan bódítási módszereket használnak kellemetlen diagnosztikus vizsgálatokhoz, kisebb műtétekhez, mint amilyent mi itt a fogorvosi – implantológiai vagy bőrgyógyászati rendelőben.

A bódítás – éber szedáció alatt tudunk kommunikálni, tud együttműködni velünk, megmaradnak a nyelési és egyéb reflexek, de oldódik a félelme, csak a kezelés kezdetére és végére fog igazából emlékezni. A bódításnak van fájdalomcsillapító hatása is, de mindig alkalmazunk mellette felületes vagy injekciós fájdalomcsillapítást is.



A KEZELÉSEKET ANESZTEZIOLÓGUS SZAKORVOS ÉS ASSZISZTENS VÉGZI
Klinikánkon megbízásunk alapján, a kezeléseket alatti bódítást a SE-DA Bt., Dr. Bátorfi Árpád vezetésével végzi



DINITROGÉN-OXID

nevetőgáz

A nevetőgázt saját magának adagolhatja

Ha Ön fél a kezeléstől, vagy csak az injekciótól, vagy csak egyszerűen könnyebben akarja venni az egész kezelést, úgy a legegyszerűbb bódítási módot, a Dinitrogén-Oxid - nevetőgáz alkalmazását javasoljuk.

ELŐNYE:

Előnye, hogy néhány belégzés után azonnal hat és a kezelés után 2 percen belül megszűnik a hatása. A kezelés után egyedül, kísérő nélkül is vezethet, teljesen kiürül a szervezetéből.

FONTOS TUDNI A KÖVETKEZŐKET:



Fogorvosi kezelésre, orrmaszkkal

- Elsősorban félelem oldására használható.
- Ön szinte mindenre emlékezni fog, de nem lesz rossz emléke.
- Bőrön, nyálkahártyán érzéstelenítő hatása van, de szükséges további érzéstelenítés is.
- Szükséges együttműködni velünk, ha nagyon elutasítja a kezelést, azt a gáz nem tudja legyőzni és ezért sikertelen lesz a bódítás. Ekkor az intravénás kezelést javasoljuk.
- Általában hányáscsillapító hatása van, de 1 %-ban hányingert okoz.
- Gyermekeknél is alkalmazható.
- Terhesség első harmadában nem javasolt.
- B 12 vitamin vagy folsav hiányos betegség esetén nem alkalmazható.
- Nyugtatók vagy drog alkalmazása mellett nem használható.
- Magas vérnyomás vagy szívbetegség nem kizáró ok, de az orvosnak tudnia kell róla.
- Rövidebb kezelésekre javasoljuk.
- Fiatalabb embereknél biztosabban hat, mint időseknél.



INTRAVÉNÁS BÓDÍTÁS

a megterhelőbb kezelésekhez

Ha hosszabban tartó, komolyabb megterhelést jelentő kezelést, műtétet kell végeznünk vagy a fent leírtak alapján a nevetőgáz nem javasolt, akkor az Intravénás bódítást javasoljuk.

ELŐNYE:

Előnye, hogy jobban kikapcsolja a tudatát, nem fog emlékezni a kezelésre és jobban legyőzi a félelmet, szorongását.

FONTOS TUDNI A KÖVETKEZŐKET:

- Jelentősebb, biztosabb hatása van.
- Csak a kezelés elejére és végére fog emlékezni.
- Akár két óra hosszát tartó kezelést is lehet vele végezni.
- Nyugtatók vagy drog alkalmazása mellett nem használható.
- Terhesség első harmadában nem javasolt.
- Magas vérnyomás vagy szívbetegetség nem kizáró ok, de az orvosnak tudnia kell róla.
- Kezelés után legalább egy fél órát kell a pihenő szobánkban várakoznia, csak kísérelével távozhat és egy napig nem vezethet autót, nem dolgozhat veszélyes helyen vagy gépekkel.



További információt orvosainktól vagy szaktanácsadó asszisztensünktől fog kapni.



A bódítás után csendes, barátságos környezetben pihenhet

MIT ÉREZ A KEZELÉS KÖZBEN?

Mindenki másképp éli meg a bódult állapotot

Természetesen mindenkinek más és más. Többszer bódításos esetünkben nincs két egyforma. Legtöbbször semmire sem emlékeznek és csodálkoznak, hogy miért vannak már az ébredőben.

- A szer adását követően először enyhe szédülést érezhet, majd keze-lába zsibbadni fog.
- Ezután minden lassan elnehezedik, beszéde elnyújtott, nehezen érthető lesz.
- A szorongás, gátlások feloldódása miatt sokan elkezdnek beszélni, leggyakrabban kommentálják mit éreznek.
- Van aki elalszik, de könnyen ébreszthető.
- Ébredéskor gyakran az idő eltűnik, de mégis úgy érzi, hogy hosszan tartott. Ez azt jelenti, hogy csak az utolsó percekre emlékszik, de azt hosszúnak éli meg.

Ez a beavatkozás az egyik legkevesebb veszélyes szövődménnyel járó orvosi kezelés.

A fontosabb lehetséges szövődmények:

- hányinger, hányás, aspiráció (félrenyelés)
- csökkenő légzésszám, hypoxia (légzészavar)
- vérnyomáscsökkenés
- gyógyszerallergia
- fejfájás
- lila folt a tűszúrás helyén (haematoma)
- a kezelést extrém módon elutasító pacienseknek a nagyobb dózis sem használ kellő mértékben

Kérjük, hogy a szer pontos adagolásához adja meg az alábbi adatokat:

Név:

Napló szám:

Testsúly: kg

Magasság: cm

Életkor: év

A BÓDÍTÁS KÖLTSÉGE:

Nevető gázzal, csak az injekció beadásához:	50 EUR
Nevető gázzal:	90 EUR
Intravénás bódítás első óra:	300 EUR
További minden megkezdett fél óra:	120 EUR

A fentieket megértettem és elfogadom, beleegyezek és kérem a kezelés elvégzését.

Sopron,

A kezelést kérő

Orvos

Asszisztens

DENTALKLINIK & LASERKLINIK Dr.TOKA

9400 SOPRON, LACKNER K. UTCA 62/B