

DENTALKLINIK & LASERKLINIK Dr.TÓKA

9400 SOPRON, LACKNER K. UTCA 62/B

BÓDÍTÁS

STRESSZMENTES, NYUGODT ÁLLAPOT KEZELÉS KÖZBEN



TÁJÉKOZTATÓ FÜZET BÓDÍTÁSBAN VÉGZETT KEZELÉSEKHEZ

Az orvoslás nagy eredménye, hogy a kezeléseket már fájdalom nélkül, érzéstelenítésben tudjuk végezni. Sokan azonban félnek a kezelésektől és ez a félelem, szorongás megnehezíti a pontos, precíz munkavégzést. Ilyenkor ajánljuk, hogy a kezelést bódításban végezzük el. Világszerte ugyanolyan bódítási módszereket használnak kellemetlen diagnosztikus vizsgálatokhoz, kisebb műtétekhez, mint amilyent mi itt a fogorvosi – implantológiai, vagy bőrgyógyászati rendelőben.

A bódítás – éber szedáció alatt tudunk kommunikálni, tud együttműködni velünk, megmaradnak a nyelési és egyéb reflexek, de oldódik a félelme, csak a kezelés kezdetére és végére fog emlékezni. A bódításnak van fájdalomcsillapító hatása is, de mindig alkalmazunk mellette helyi érzéstelenítést is.



INTRAVÉNÁS BÓDÍTÁS

a megterhelőbb kezelésekhez

AZ INTRAVÉNÁS SZEDÁCIÓ ELŐNYE

Előnye, hogy jobban kikapcsolja a tudatát, nem fog emlékezni a kezelésre és jobban legyőzi a félelmet, szorongást. A szedáció alatt az altatóorvos (aneszteziológus) és az ő asszisztensei folyamatosan ellenőrzik a Páciens állapotát és személyre szabottan adagolják a szert.

FONTOS TUDNIVALÓK:

- Bódítás után 24 órán keresztül tilos gépjárművet vezetni, veszélyes helyen vagy gépekkel dolgozni, illetve alkoholt fogyasztani
- 24 órán keresztül nem írhat alá semmilyen fontos dokumentumot
- Amennyiben autóval érkezik klinikánkra és még aznap hazautazik, csak kísérel távozhat
- Kérjük, hogy ne egyen és igyon 2 órával a bódítás előtt
- Csak a kezelés kezdetére és végére fog emlékezni
- A kezelés időtartama akár 2 óra is lehet
- Nyugtató vagy drog alkalmazása mellett a bódítás nem alkalmazható
- Terhesség első harmadában nem javasolt
- Magas vérnyomás vagy szívbetegség nem kizáró ok, de orvosával konzultálnia kell
- Megfigyelés miatt kezelés után legalább fél órát kell a pihenő szobánkban várakoznia



További információkért forduljon bizalommal kezelőorvosához vagy szaktanácsadónkhoz.



MIT ÉREZ A KEZELÉS KÖZBEN?

Mindenki másképp éli meg a bódult állapotot

Természetesen mindenkinek más és más a tapasztalata, nincs két egyforma eset. Nagyon ritkán előfordul, hogy a nyugtató hatás nem vagy alig jelentkezik. A legtöbben semmire sem emlékeznek és meglepetten tapasztalják, hogy már az ébredőben vannak.

- A szer beadását követően enyhe szédülést érezhet, majd karjait-lábait nehéznek érezheti
- Ezután minden lassan elnehezedik, beszéde elnyújtott, nehezen érthető lesz
- A szorongás, gátlások feloldódása miatt sokan beszédesebbé válnak
- Egyes Páciensek elalszanak, de könnyen ébreszthetőek
- A kezelés után átmenetileg romlik az időérzés



Bódítás után csendes, barátságos környezetben pihenhet.

Ez a beavatkozás az egyik legkevesebb veszélyes szövődménnyel járó orvosi kezelés. A fontosabb lehetséges mellékhatások:

- Hányinger, hányás, aspiráció (félrenyelés)
- Csökkenő légzésszám, hypoxia (légzészavar)
- Vérnyomáscsökkenés
- Gyógyszerallergia
- Fejfájás
- Lila folt a tűszúrás helyén (haematoma)
- A kezelést extrém módon elutasító Páciensnek nagyobb dózis sem használ kellő mértékben

Kérjük, hogy a pontos adagoláshoz adja meg az alábbi adatokat:

Név:

Páciens ID:

Testsúly: kg

Magasság: cm

Életkor: év

A KEZELÉS KÖLTSÉGE:

Intravénás szedáció első óra: **300 EUR**

Minden megkezdett további fél óra: **120 EUR**

Az éber szedációt aneszteziológus szakorvos végzi. A felelős altatóorvos klinikánkon Dr. Bátorfi Árpád és munkatársai. Bármilyen további kérdést szívesen megválaszolnak.

A fentieket megértettem és elfogadom. Kezelőorvosomat kórtörténetemről maradéktalanul tájékoztattam és tisztában vagyok a lehetséges szövődményekkel. A bódításban történő kezelésbe beleegyezek.

Sopron,

Páciens

Orvos

Asszisztens

DENTALKLINIK & LASERKLINIK Dr.TÓKA

9400 SOPRON, LACKNER K. UTCA 62/B