

DENTALKLINIK Dr.TOKA

9400-SOPRON, LACKNERK. STR. 62/B

DIE SEDIERUNG FÜR STRESSFREIE BEHANDLUNGEN



INFORMATIONEN ZU BEHANDLUNGEN IM DÄMMERSCHLAF

Die Erfindung der Lokalanästhesie war ein Meilenstein in der Zahnmedizin. Obwohl diese für eine schmerzfreie Behandlung sorgt, plagt einige Patienten dennoch Sorge vor einem Eingriff oder vor der Betäubungsspritze selbst. Übermäßiger Stress beim Patienten während der Behandlung kann die Arbeit des Zahnarztes allerdings erschweren. Für diesen Fall bieten wir Ihnen Behandlungen in Sedierung an. Für die Sedierung stehen den Ärzten verschiedene Medikamente zur Verfügung, die nicht nur in der Zahnmedizin und Dermatologie, sondern auch bei allgemeinmedizinischen Untersuchungen oder kleineren Operationen verwendet werden können.

Die Sedierung, auch Dämmerschlaf genannt, hat den Vorteil, dass der Arzt während der Behandlung mit dem Patienten kommunizieren kann, der Patient aus eigener Kraft den Mund öffnen, atmen und bei Bedarf frei schlucken kann. Dies sind auch die Hauptunterschiede zur Vollnarkose. Die Patienten können sich meist nur an den Anfang und das Ende der Behandlung erinnern. Die Hauptaufgabe der Sedierung ist es, Angst und Nervosität des Patienten zu lösen, sie ist selbst allerdings nicht für die Schmerzhemmung verantwortlich. Aus diesem Grund wird neben der Sedierung selbstverständlich auch eine Spritze zur lokalen Anästhesie gegeben.

Obwohl die Sedierung als sehr sichere Behandlungsart gilt, kann es in seltenen Fällen zu Nebenwirkungen kommen. Zu diesen zählen:

- Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Aspiration
- Verminderte Atmung, Hypoxie
- Blutdruckabfall
- Allergie
- Kopfschmerzen
- Hämatom an der Einstichstelle der Kanüle
- Verminderte Wirkung des Medikaments aufgrund hoher Toleranz

Bitte geben Sie die folgenden Informationen für die korrekte Dosierung an:

Name: Patientennummer: Gewicht: kgGröße: cmAlter: Jahre**KOSTEN DER SEDIERUNG:**Intravenöse Sedierung erste Stunde: **320 EUR**Jede weitere begonnene halbe Stunde: **140 EUR**

Die Anästhesie wird bei uns von einem Anästhesisten durchgeführt. Die verantwortlichen Narkoseärzte an unserer Klinik sind Dr. Bátorfi Árpád und seine Kollegen. Gerne können Fragen an ihn weitergeleitet werden.

Ich habe die oben stehenden Informationen gelesen und habe sie verstanden. Ich habe meinen Arzt über meine medizinische Vorgeschichte vollständig informiert und bin über die eventuellen Risiken aufgeklärt worden. Ich bin mit der Behandlung in Sedierung einverstanden.

Sopron, **DENTALKLINIK Dr.TOKA**

9400-SOPRON, LACKNERK. STR. 62/B



INTRAVENÖSE SEDIERUNG für längere Behandlungen



WAS FÜHLEN SIE WÄHREND DER BEHANDLUNG? Jeder Patient empfindet die Sedierung etwas anders

DER VORTEIL DER INTRAVENÖSEN SEDIERUNG

Während der Sedierung wird Ihr Bewusstsein fast gänzlich ausgeschaltet und Sie verfallen in einen sogenannten Dämmer Schlaf. Dabei werden Sie durchgehend von einem Anästhesisten (Narkosearzt) und seinen Assistenten überwacht. Die Dosierung des Medikaments, welches die Sedierung aufrecht erhält, wird individuell auf den Patienten abgestimmt.

Bei manchen Patienten wirkt die Sedierung stärker als bei anderen. In seltenen Fällen schlägt das Sedierungsmittel nicht oder nur kaum an. Dies ist allerdings äußerst selten der Fall. Die meisten Patienten können sich gar nicht an die Behandlung erinnern und sind überrascht, wie schnell Sie im Relaxraum wieder zu sich gekommen sind.

FOLGENDES SOLLTEN SIE WISSEN:

- Sie dürfen nach der Sedierung 24 Stunden kein Auto fahren, keine gefährlichen Maschinen bedienen oder Alkohol konsumieren
- Sie sollten für 24 Stunden keine Dokumente unterschreiben
- Kommen Sie, wenn Sie mit dem Auto anreisen und am selben Tag noch nach Hause fahren möchten, bitte immer in Begleitung
- Wir bitten Sie, 2 Stunden vor der Sedierung weder zu essen, noch zu trinken
- Sie werden sich nur an den Anfang und das Ende der Behandlung erinnern
- Die Wirkung kann bis zu über zwei Stunden aufrecht erhalten werden
- Bei Patienten, die regelmäßig Beruhigungsmittel oder Drogen konsumieren, kann keine Sedierung durchgeführt werden
- In den ersten 3 Monaten einer Schwangerschaft wird eine Sedierung nicht empfohlen
- Bluthochdruck und Herzerkrankungen schließen eine Sedierung nicht aus, es sollte jedoch Ihr behandelnder Arzt konsultiert werden
- Nach der Behandlung müssen Sie mindestens eine halbe Stunde zur Beobachtung in unserem Relaxraum bleiben



Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem behandelnden Arzt oder der Rezeption.

- Sie können sich ein wenig schwindelig fühlen, Arme und Beine können sich schwer anfühlen
- Die Sprache wirkt oft etwas verwaschen
- Aufgrund der gesunkenen Hemmschwelle steigt bei einigen der Rededrang
- Einige Patienten schlafen sofort tief ein, sind aber leicht zu wecken
- Das Zeitempfinden kann nach der Behandlung noch kurzzeitig beeinträchtigt sein



Nach der Sedierung können Sie sich in einer ruhigen, freundlichen Umgebung entspannen.